

**Indicaciones:** RICOVERM es un antiparasitario inyectable estéril de amplio espectro que actúa sobre los distintos estadios de parásitos gastrointestinales y pulmonares.

Está indicado para el tratamiento de las infestaciones por *Haemonchus sp*, *Trichostrongylus sp*, *Ostertagia sp*, *Nematodirus sp*, *Strongylus sp*, *Cooperia sp*, *Oesophagostomum sp*, y *Dictyocaulus sp*.

**Vía de administración:** Aplicar por vía subcutánea delante o detrás de la paleta.

**Dosificación:** La dosis recomendada para bovinos es de 1 mL cada 40 kg de peso vivo.

Peso (Kg)	Dosis (mL)	Peso (Kg)	Dosis (mL)
40	1	240	6
80	2	280	7
120	3	320	8
160	4	360	9
200	5	400	10


En Uruguay: En caso de ostertagiasis se recomienda duplicar la dosis

**Precauciones:** No inyectar más de 10 mL por punto de aplicación.

**Período de retiro:** No sacrificar los animales destinados a consumo humano hasta después de transcurridos 14 días de aplicado el último tratamiento. La leche sólo podrá ser consumida luego de transcurridos 3 días de la última aplicación.

**NUEVO**  
**NO IRRITA**

USO VETERINARIO



RICOBENDAZOL 15%®

**Ricoverm**  
**König**

**Antiparasitario interno  
inyectable estéril  
para bovinos**

**Venta bajo receta  
Industria Argentina - Contenido neto**

**625 mL | 125 DOSIS**  
**X FRASCO**



**Acciones colaterales:** No se presentan a las dosis indicadas.

**Contraindicaciones:** No utilizar RICOVERM durante los primeros 45 días de gestación y/o hasta 45 días después de remover los toros.

**Fórmula:** Ricobendazole 15,00g%P/V; Excipientes c.s.p. 100 mL.

**Conservar entre 4 y 35° C.**

**Vencimiento:** 2 años a partir de la fecha de elaboración.

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Centros Toxicológicos:** Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. Bolivia: Llamar o acudir al médico. Ecuador: Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. Honduras: Llamar o acudir al médico. Panamá: CIMET Tel: (507) 269-2741. Paraguay: Ctro. Nacional de Toxicología 220-418, 204-800 (int. 1011). Perú: CICOTOX Tel. 0800-1-3040. República Dominicana: CIDI. Tel: (1809) 562-6601 ext. 1801. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586.

En Argentina  
 SENASA Cert. Nº 96.533  
 Estab. E'lab, Nº 5.580  
 Elaborado y distribuido por Laboratorios König S.A., Av. B. Rivadavia 719, B1869A04, Avellaneda, Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141, consultatecnica@koniglab.com Director Técnico Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario. M.N. 3136.

En Uruguay: MGAP Nº A-2238. Imp. y dist. por König Uruguay S.A. San Fructuoso 1169, Montevideo, Tel. (+598) 22039320, direcciontecnicauy@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Raúl Leites. En Bolivia: SENASAG CR-PUV Nº 660/2005 Imp. y dist. por VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. Av. Piraí Nº 493, Santa Cruz. Tel: (03) 352-0261 Dir. Tec. Ernesto Rojas V. En Ecuador: Cert. Nº 041-9669-AGROCALIDAD. Imp. y dist. por ECUAQUIMICA C.A. Av. Iltalo Km 1,5 entre Cienes y Alondras, Via al Tingo, Quito, Tel. 022 861 690, Responsable Técnico Dr. Fausto Yáñez. En Honduras: Comercializa y dist. IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V. Residencial Monte Bello, Bl.43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras. C.A. Tel. (00504) 2565- 8847. Medico Reg. Dr. Abelardo Mejía Pineda. En Paraguay: Imp. por CRESUR S.A. Av. J.F. Bogado 1428, ATC (021) 333-407, Reg. SENACSA Nº 5.546. RUC: 80014725-1 Reg. Alicia Escobar R.L., N.º: 1882. En Perú:

SENASA Reg. Nº xxx. Comerc. por VETNOVA S.A. Alameda del corredor 2720 Uro. La Capilla-La Molina, Lima, Perú. Tel: 3657825. En Venezuela: Importado y distribuido por Representaciones ADALCA, C.A. RIF: J-30295110-0, Registro Nº M.1.7.018, Tel. 0241-871-6071 / 7340, Valencia, Asesora Técnica: Dra. Carmen Cavet, M.V. CPE 0712253328. QH 9443-V8

**König**  
www.koniglab.com



Serie:  
Elaboración:  
Vencimiento: