

Aplonal® 5mg

(meglumina de flunixin)

**Antiinflamatorio - Analgésico
Antipirético para caninos**

uso veterinario

Venta bajo receta

El principio activo de APLONAL es la meglumina de flunixin, un potente analgésico no esteroide, no narcótico con propiedades antiinflamatorias y antipiréticas. APLONAL actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, mediadores del dolor y la inflamación, sintetizados a partir de los ácidos grasos liberados de los tejidos injuriados.

INDICACIONES Y USOS:

APLONAL está indicado para el alivio del dolor y la inflamación de cualquier origen, incluyendo el dolor músculo-esquelético, post-traumático y post-quirúrgico.

VIAS DE ADMINISTRACION Y DOSIS:

APLONAL debe administrarse por vía oral en dosis de 1 mg de flunixin por kilo de peso (1 comprimido cada 5 kg) por día durante 3 (tres) días consecutivos como máximo.

En casos crónicos, alternar 3 días de tratamiento con 4 días sin medicación por un periodo máximo de 3 meses.

CONTRAINDICACIONES:

APLONAL no debe administrarse a los gatos.

No administrar a hembras gestantes.

EFFECTOS ADVERSOS:

Esporádicamente pueden aparecer vómitos y diarreas, en cuyo caso deberá suspenderse el tratamiento.

PRECAUCIONES:

Los estudios de toxicidad en perros demostraron un efecto tóxico gastrointestinal característico de todos los antiinflamatorios no esteroides. La dosis máxima tolerable es de 2.2 mg/kg, por lo tanto se debe respetar las indicaciones en cuanto a dosificación y duración del tratamiento.

No administrar a caninos con trastornos digestivos o insuficiencia renal.

No administrar a caninos con perfusión renal disminuída (deshidratación, hipotensión, etc).

Evitar la asociación con sustancias que presenten toxicidad renal. Debe evitarse el uso concomitante con corticosteroides y con otros fármacos antiinflamatorios no esteroides.

COMPOSICION:

Cada comprimido contiene: meglumina de flunixin, 8,3 mg (equivalente a 5 mg de flunixin base); excipientes, c.s.p. 300,0 mg.

PRESENTACION:

Estuche conteniendo un blister con 12 comprimidos.

Conservar entre 4 y 35° C

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centros Toxicológicos: Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Ecuador:** Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel:(021) 204-800/532

En Argentina:

■ SENASA Cert. N° 98.108
■ Estab. Elab. N° 5.580



En Argentina: Elaborado y distribuido por **Laboratorios König S.A.** Av. B. Rivadavia 719, B1868AOA. Avellaneda, Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141. consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario. M.N. 3136.

En Uruguay: MGAP N° A 2.817. Importado y distribuido por **König Uruguay S.A.** San Fructuoso 1169, Montevideo. Tel. (02) 208-3920. direcciontecnicauy@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Raúl Leites.

En Bolivia: SENASAG CR-PUV N° xxx. Importado y distribuido por **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Av. Pirai N° 493, Santa Cruz. Tel: (03) 352-0261 Dir. Tec.: Ernesto Rojas V.

En Ecuador: Cert. N° xxx AGROCALIDAD. Importado y distribuido por **Ecuaquímica C.A.** Av. J.S. Castillo y J. Tanca Marengo, Guayaquil, Tel. (04) 268-2050 Dir. Téc: Dr. Fausto Yáñez.

En Panamá: M.I.D.A. Reg. N° RF-4402-08. Importado y distribuido por **DISTRIVET S.A.**, Juan Diaz calle 1b, Tel.: 507-2205821. distrivet@cablonda.net Resp. téc.: Dra. Enilda Pinto ID. 728.

En Paraguay: Reg SENACSA N° 6.290. Importado por **CRESUR S.A.** Av. J.F. Bogado 1428 ATC (021) 333-407.

En Perú: SENASA Reg. N° xxx Comercializado por **VETNOVA S.A.** Alameda del corredor 2720 Urbanización La Capilla-La Molina, Lima, Perú. Tel.: 3657625.

En Venezuela: Reg. MAT SASA N° 7.746. Importado por **Representaciones ADALCA, C.A.** Rif. J-30295110-0. Tel.: 0241-871-60-71 / 871-73-40, Valencia, Asesor Técnico Dr. Carlos Durand M.V. CPE1207143775