

Comprimidos Antiparasitario de amplio espectro Para caninos

Uso Veterinario Venta Baio Receta

BASKEN® 4 APR es una exclusiva formulación antiparasitaria de amplio espectro que controla las infestaciones por nematodes, cestodes y giardias que afectan a caninos.

BASKEN® 4 APR combina cuatro principios activos eficaces y seguros: pamoato de pirantel, pamoato de oxantel, oxfendazol y praziquantel. Las pruebas de eficacia han demostrado que una dosis única posee una altísima eficacia antiparasitaria. BASKEN® 4 APR es eficaz contra parásitos adultos, formas inmaduras de tenias y larvas de nematodes, evita los daños de migración larval en pulmones e hígado.

Fórmula:

Cada comprimido de 150 mg contiene: pamoato de pirantel, 36,25 mg; pamoato de oxantel, 35,0 mg; oxfendazol, 28,25 mg; praziquantel 12,50 mg; excipientes c.s

Cada comprimido de 300 mg contiene: pamoato de pirantel, 72,5 mg; pamoato de oxantel, 70,0 mg; oxfendazol, 56,5 mg; praziquantel 25,0 mg; excipientes, c.s. Cada comprimido de 600 mg contiene: pamoato de pirantel, 145 mg; pamoato de oxantel, 140,0 mg; oxfendazol, 113,0 mg; praziquantel 50,0 mg; excipientes, c.s. Cada comprimido de 1200 mg contiene: pamoato de pirantel, 290,0 mg; pamoato de oxantel, 280,0 mg; oxfendazol, 226,0 mg; praziquantel 100,0 mg; excipientes. c.s.

Indicaciones: BASKEN® 4 APR es eficaz contra: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeforme, Trichuris vulpis, Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia multiceps, Taenia taeniformis, Taenia pisciformis. Taenia ovis. Giardia spp.

Dosis y administración: Administrar 1 comprimido de 150 mg cada 2,5 kg de peso vivo, 1 comprimido de 300 mg cada 5 kg de peso vivo, 1 comprimido de 600 mg cada 10 kg de peso vivo y 1 comprimido de 1.200 mg cada 20 kg de peso vivo.

Dosis de activos por kg de peso: pamoato de pirantel, 14,5 mg/kg (5 mg/kg de pirantel); pamoato de oxantel, 14,0 mg/kg (5 mg/kg de oxantel); oxfendazol, 11,3 mg/kg; praziquantel, 5 mg/kg.

Intervalo entre dosis: En general, una sola dosis es suficiente para lograr la desparasitación deseada. En animales gerontes e inmunosuprimidos, en los que se producen migraciones larvales, se recomienda administrar una segunda dosis a los 15 días de la primera. En caso de existir condiciones que propicien la reinfestación, repetir el tratamiento cada 3 ó 4 meses. En caso de infestación por Giardia spp. administrar durante 3 días consecutivos. En caso de trichuriasis severas, administrar durante 3 días consecutivos

Margen de seguridad: Amplio margen de seguridad. No produce efectos colaterales.

Contraindicaciones: A las dosis indicadas no posee contraindicaciones, de todas formas se recomienda no administrar a cachorros menores de tres semanas de vida, ni a hembras durante el primer tercio de la gestación ó en lactación con cachorros menores de 21 días. NO ADMINISTRAR A GATOS.

Precauciones: No requiere ayuno previo ni posterior al tratamiento. El comprimido puede ser triturado y mezclado con el alimento. En hembras gestantes se administrará 10 días antes de la parición. Su administración es compatible con tratamientos paralelos tales como vacunaciones y aplicación de antiparasitarios externos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión accidental concurrir, con el prospecto, al centro toxicológico más cercano. Centros Toxicológicos: Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. Bolivia: Llamar o acudir al médico. Ecuador: Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. Honduras: Ilamar o acudir al médico. Panamá: CIMET Tel: (507) 269-2741. Perú: CICOTOX Tel. 0800-1-3040. Paraguay: Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-800/532. República Dominicana: CIDI. Tel: (1809) 562-6601 ext. 1801. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586.

Conservación: Mantener el producto en un lugar fresco y seco. Conservar a temperaturas comprendidas entre 4° v 35° C.

Presentaciones:

- -BASKEN® 4 APR *perros chicos*: blister conteniendo 4 (cuatro) comprimidos de 150 mg cada uno, en estuche con prospecto adjunto.
- -BASKEN® 4 APR *perros medianos*: blister conteniendo 4 (cuatro) comprimidos de 300 mg cada uno, en estuche con prospecto adjunto.
- -BASKEN® 4 APR perros *grandes*: blister conteniendo 4 (cuatro) comprimidos de 600 mg cada uno, en estuche con prospecto adjunto.
- BASKEN® 4 APR perros *gigantes*: blister conteniendo 3 (tres) comprimidos de 1.200 mg cada uno, en estuche con prospecto adjunto.

Vencimiento: 3 (tres) años a partir de la fecha de elaboración.

SENASA. Certificado Nº 04-280 Estab. Elab.: N° 5580

₩ König

En Argentina: Elaborado y distribuido por Laboratorios König S.A. Av. B. Rivadavia 719. B1868AOA. Avellaneda.
Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141. consultatecnica@koniglab.com

Dir. Têc. Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario. M.N. 3136.

En Uruguay: MGAP № xxx. Importado y distribuido por König Uruguay S.A. San Fructuoso 1169, Montevideo. Tel.

(20) 200 3000 disensitatoriosus/Glosideb opp. Dir. Téc. Dr. Bod Liette.

(02) 208-3920 direcciontecnicauy@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Raúl Leites.

En Bolivia: SENASAG CR-PUV N° xxx. Importado y distribuido por VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. Av. Pirai N°

n bolivia: Senasag Cr-Pou nº xxx. Importado y distribuído por VeTerdudinica Bullviana S.R.L. Av. Pirai nº 493, Santa Cruz.TEL: (03) 352-0261Dir. Tec.: Ernesto Rojas V. En Ecuador: № xxx AGROCALIDAD . Importado y distribuído por Ecuaquímica C.A. Av. J.S. Castillo y J. Tanca

Marengo, Guayaquil. Tel. (04) 268-2050 Dir. Téc: Dr. Fausto Yánez. En Honduras: comercializa y distribuye IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.

Residencial Monte Bello, Bl.43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2565-6847.
Medico Regente: Dr. Abelardo Meija Pineda.

En Paraguay: Importado por CRESUR S.A. Äv. J.F. Bogado 1482 ÅTC (021)333-407- Reg. SENACSA N° xxx En Perú: SENASA Reg. N° xxx Comercializado por VETNOVA S.A. Alameda del corregidor 2720 Urbanización La Capilla-La Molina. Lima. Perú. Tel: 3657625

www.koniglab.com