

administración del producto. La dosis tóxica del cobre puede corresponderse a tres veces la dosis terapéutica contenida en este producto, la doble dosificación puede afectar la salud de los animales. Evitar procedimientos de manejo fuertemente estresantes tales como descorne y castración dentro de las 48 horas anteriores al tratamiento. El sitio de aplicación óptimo es el hueco existente por detrás de la paleta por vía subcutánea únicamente. No utilizar el producto por vía intramuscular o endovenosa. Emplee jeringas bien calibradas, aguja 12 x 18 en animales adultos y 10 x 18 en terneros, ajuste la dosis al peso del animal. Debe ser administrado

Preventivo y curativo en casos de deficiencias de zinc, cobre, manganeso y selenio en bovinos. Optimiza la producción, la función reproductiva y el sistema inmune.

FÓRMULA: EDTA Disódico Manganeso, 7,10 g%; EDTA Disódico Zinc, 24,45 g%; EDTA disódico Cobre, 12,50 g%; Selenito de Sodio, 1,10 g%; excipientes y vehículo acuoso estéril c.s.p 100 mL.

Aporte mineral: Zinc: 40mg/mL; Cobre: 20mg/mL; Manganeso: 10mg/mL; Selenio: 5mg/mL.

DOSIS: Indicada para todas las categorías en bovinos.

- 1mL cada 100 kilos de peso vivo.

bajo la supervisión de un veterinario

Conservar a temperatura entre 4 y 35° C

Vencimiento: 2 (dos) años a partir de la fecha de elaboración.

Mantener fuera del alcance de los niños.

CENTROS TOXICOLÓGICOS: Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Ecuador:** Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. **Panamá:** CIMET Tel: (507) 269-2741. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel.(021) 204-800/532. **República Dominicana:** CIDL Tel: (1809) 562- 6601 ext. 1801. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.

VÍA DE APLICACIÓN: aplicación subcutánea exclusivamente.

PROGRAMA DE SUPLEMENTACIÓN RECOMENDADO:

- **Toros:** 3 veces por año.
- **Vacas -carne:** 4 semanas antes del servicio; 4 semanas antes del parto.
- **Vacas -leche:** 4 semanas antes del parto; 4 semanas antes de la inseminación; 4 semanas antes del período de seca.
- **Terneros:** una aplicación a las 24 horas de nacido; una aplicación al destete.
- **Vaquillonas:** cada 3 meses; especialmente antes del servicio.

ADICIONAL: Inducción a feed lots, antes o durante un cambio de alimentación,

En Argentina:
 ■ SENASA Cert. N° 11-081
 Estab. Etb. N° 5.580.
 Elaborado y distribuido por Laboratorios König S.A. Av. B. Rivadavia 719, B1888ADA, Avellaneda, Buenos Aires Tel. (011) 4208-1414, consultatecnica@koninglab.com Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario, M.N. 3136.
 En Uruguay: MGAP N° xxx, Imp. y dist. por **KÖMG URUGUAY S.A.** San Fructuoso 1189, Montevideo. Tel. (02) 268-3820 informaciontecnicay@koninglab.com Director Técnico: Dr. Raúl Letliff. En Bolivia: SENASAG Q3-FUV N° xxx Imp. y dist. por **VETEROUQUICA BOLIVIANA S.R.L.** Av. Píraí N° 493, Santa Cruz. Tel: (03) 352-0261. Dir. Téc. Ernesto Rojas V. En Ecuador: N° xxx-AGROCALIDAD. Imp. y dist. por **ECUAQUÍMICA C.A.** Av. J.S. Castillo y J. Tanca Marengo, Guayaquil, Tel. (04) 268-2050 Dir. Téc. Dr. Fausto Yáñez. En Guatemala: Imp. y dist. por **SUNIMTOS PORCINOS, S.A.** 3ª. Av. 41-80, zona 12 col. Monte María I. Centro empresarial Monte María, box 654, Guatemala. Tel. (02) 2479 1568 / 2479 0068. Reg. MASA N° xxx. En Honduras: Comerc. y dist. **IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.** Residencial Monte Bello, B143 casa #34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2565-6847. Med. Rep. Dr. Abelardo Mejía Pineda. En Panamá: M.L.O.A. Reg. N° xxx, Imp. y dist. por **DISTRIVET S.A.** Juan Díaz calle 1 b, Tel: 507-2205821. Resp. Téc. Dra. Emilia Pinto ID. 728. distribucion@calajonda.net. En Paraguay: Reg. SENASA N° 11306. Imp. por **CRESUR S.A.** Av. J.F. Bogado 1428 ATC (021) 333-407. En Perú: SENASA Reg. N° xxx. Comercializado por **VEITNOVA S.A.** Alameda del corredor 2720 Urb. La Capilla-La Molina, Lima - Perú. Tel: 3657825. En Venezuela: Imp. por **REPRESENTACIONES ADALCA, C.A.** Rif. J-30295110-0. Reg. MAT SASA N° xxx. Tel. 0241-871-6071 / 871-7340, Valencia. Asesor Téc. Dr. Carlos Durand M.V. D.P.E.

glypondin⁴
 multimineral

MANGANESO ZINC COBRE SELENIO

**Suplemento
 Multimineral
 Inyectable**



USO VETERINARIO
 VENTA BAJO RECETA

Lea todo el prospecto
 detenidamente antes
 de su aplicación

König

sequía, precipitaciones excesivas, frío, calor, y en el transporte y manejo. Indicado para ser aplicado junto con la vacuna antiáfotas.

FRECUENCIA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: Según criterio del profesional. **RESTRICCIONES DE USO:** El producto empleado según las recomendaciones de uso no posee restricciones.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: Confirmar la deficiencia de cobre y/o selenio. No aplicar cuando la pastura tiene un alto contenido de selenio y/o cobre. No aplicar cuando se suministra selenio y/o cobre por otra vía. No utilizar junto con suplementos granulados o fertilizantes de selenio, sin el

consentimiento Veterinario. No administrar en animales con enfermedades hepáticas, fasciolosis o que estén consumiendo plantas que pudieran producir toxicidad hepática. Utilizar con precaución en animales debilitados o enfermos. Aplicar el producto en condiciones asépticas. No aplicar a terneros recién nacidos, en los casos que se haya suplementado a las madres con cobre antes del parto. **No aplicar junto a antiparasitarios de la familia de Avermectinas, Milbemicinas como tampoco Benzimidazoles, entre otros.** No aplicar junto con vacunas cuya compatibilidad no esté justificada dentro de las 48 horas anteriores o posteriores a la