



USO VETERINARIO

Bactroflay® TAGS König

Caravanas insecticidas



Venta bajo receta
Contenido:
10 caravanas y
10 machos
Industria Argentina

Atención: lea cuidadosamente el rótulo antes de utilizar este producto
Producto tóxico clase II (toxicidad moderada)

Fórmula: Ethion (bis-ditiofosfato O, O dietílico de S, S' metileno), 40 g%; excipientes e inertes, 60 g%.



Presentaciones: Cajas conteniendo 4 sobres con 10 caravanas, cantidad equivalente de machos y aguja universal.

Indicaciones: Control y tratamiento de las infestaciones por *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos) en bovinos de carne y lecheros.

Administración y dosis: Para un adecuado control colocar 1 (una) caravana por animal. Reemplazar las caravanas cada 4 meses. Si se utilizan de acuerdo a las indicaciones BACTROFLAY TAGS mantienen una eficacia superior al 90% durante aproximadamente 4 meses. Finalizado este período se recomienda removerlas para evitar la eventual aparición de poblaciones resistentes, al quedar las moscas expuestas a dosis subletales. Colocar las caravanas utilizando una pinza aplicadora que debe desinfectarse con solución antiséptica previo a cada uso.

Tiempo de espera: No posee restricción en bovinos de carne. Período de retiro en leche: En Argentina: 48 horas. En Uruguay: No posee.

Forma de aplicación:

- Colocar la aguja universal (ubicada en la solapa del estuche) en la pinza.
- Colocar con firmeza el macho en la aguja universal.
- Colocar la caravana con la hembra, en la misma dirección que la pinza y hacia el exterior.
- Colocar la pinza sobre la oreja y presionar. La ubicación ideal es entre el segundo y tercer pliegue paralelos del cartílago auricular (tercio medio de la oreja).

Precauciones y advertencias:

Mantener en su envase original hasta su uso. Peligrosa por ingestión, aspiración y contacto con la piel. Usar ropas de trabajo que protejan toda la superficie de la piel (mameluco, guantes resistentes a químicos, barbijo y botas impermeables). No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto. No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicamentos y semillas. No utilizar en lugares próximos a arroyos, ríos y/o lagunas. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Consulte al médico veterinario. Si la caravana contacta con la piel o mucosas, lavarse con abundante agua y jabón. Cambiarse la ropa luego de la aplicación. Retirar las caravanas antes de enviar los animales a faena. La caravanas usadas, sobres y envases que deban descartarse, deben colocarse en bolsas plásticas e incinerarse en lugares permitidos y al aire libre. No debe arrojarse en cursos de agua ni enterrarse.

Contraindicaciones: No utilizar en animales menores de 3 (tres) meses por la posibilidad de daño auricular.

Información toxicológica: Los síntomas de intoxicación consisten en náuseas, cólico, diarrea, sialorrea, sudoración, fatiga, dificultad cardiopulmonar, dolor de cabeza, visión borrosa, miosis, incoordinación, contracciones musculares, calambres, convulsiones, coma y muerte. En caso de ingestión reciente, antes de iniciados los síntomas de intoxicación, provocar el vómito. Acostar al paciente de costado, con la cabeza más baja que los pies. No dar grasas, leche ni aceites. En caso de contaminación de la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de inhalación aflojar la ropa rápidamente y colocar al paciente en un lugar aireado.

Antídoto: Sulfato de atropina 1%, 2 a 4 mg por vía endovenosa o intramuscular. Repetir cada 5 a 10 minutos hasta la aparición de signos de atropinización. La 2-PAM es el antídoto farmacológico y puede ser administrado junto con la atropina pero no como sustituto de la misma.

Centros toxicológicos de referencia:

Capital: Hosp. de Clínicas (UBA), Tel.: 5950-8804/ 06, Hosp. de Niños "R. Gutiérrez", Tel.: 4962-2247/ 6666; **Bs. As.:** Ctro. Nac. de Intoxicac.: 0800-333-0160; **La Plata:** Ctro. de Atención Toxic.: (0221)-451-5555; **Santa Fe:** Sanatorio de niños, servicio de toxic., Tel.: (0341)-448-0202; **Córdoba:** Hosp. de niños, Tel.: (0351)-458-6400/55; **Mendoza:** Ctro. de Información Toxic., Tel.: (0261)-425-0284/423-1123; **Neuquén:** Hosp. Castro Rendón, Tel.: (0299)-449-0800; **Tucumán:** Hosp. del niño Jesús, Tel.: (0381)-424-7083; **Ecuador:** Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. **El Salvador:** Hospital San Rafael teléfono 2525-5800 ext 148 y 149. **Guatemala:** CIAT Tel. (502) 22513560 - (502) 22320735. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **Panamá:** CIMET Tel: (507) 269-2741. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722.

Conservar entre 4° y 35° C.

Nota: El fabricante garantiza la calidad del producto siempre que se comercialice en su envase original cerrado. El fabricante no se responsabiliza por el daño resultante de una incorrecta conservación y/o uso no acorde con las indicaciones de este rótulo.

En Argentina:

SENASA Cert. Nº 04-038
Estab. elab. Nº 8.596

Distribuido por **LABORATORIOS KÖNIG S.A.** Av. B. Rivadavia 719. B1868AOA. Avellaneda. Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141 consultatecnica@koniglab.com. Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario, M.N. 3136. **En Uruguay:** MGAP Nº. A4032 Imp. y distr. por **KÖNIG URUGUAY S.A.** San Fructuoso 1169, Montevideo. Tel. (+598) 22083920. Dir. Téc. Dr. Raul Leites, direcciontecnicauy@koniglab.com **En Ecuador:** Nº XXX-AGROCALIDAD. Imp. y distr. por **ECUAQUÍMICA C.A.** Av. Ilaó Km 1.5 entre Cisnes y Alondras, Via al Tingo, Quito, Tel. 022 861 690. Resp. Téc. Dr. Fausto Yáñez. **En El Salvador:** Imp. y distr. por **SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S.A. DE C.V.** edificio Avante, suite 5-01, Blvd. Luis Poma, Santa Elena, Antiguo Cuscatlan, El Salvador Tel. (503) 2505 5555/5565. **En Guatemala:** Imp. y distr. por **SUMINISTROS PORCINOS, S.A. 3ª.** Av. 41-60, zona 12 col. Monte María I. Centro empresarial Monte María, bodega 104, Guatemala. Tel. (502) 2479 1568 / 2479 0066. Reg. MAGA Nº xxx. **En Honduras:** comerc. y distr. **IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.** Residencial Monte Bello, Bl.43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2565-6847. Med. Reg.: Dr. Abelardo Mejía Pineda. **En Panamá:** M.I.D.A. Reg. Nº RF-4518-08 Importado y distribuido por **DISTRIVET S.A.** Juan Díaz calle 1b. Tel.: 507-2205821. distrivet@cablonda.net Resp. téc. Dra. Enilda Pinto ID. 728. **En Perú:** Imp. y distr. por **GLOBALVET S.A.** Calle Mario Valdivia Nº 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima, Perú. Tel. (511) 719-0377. **En Venezuela:** Imp. por **REPRESENTACIONES ADALCA, C.A.** Rif: J-30295110-0. Reg. MAT SASA Nº xxx. Tel.: 0241-871-6071/7340, Valencia. Asesora Técnica Dra. Carmen Cavet, M.V.

Vencimiento: 2 años a partir de la fecha de elab.

Lot:

Elab:

Venc:


www.koniglab.com

SO9438-V6