

COMPOSICIÓN: Cada 100 mL contiene:
Ivermectina 3,15 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

INDICACIONES:

Tratamiento, control y profilaxis de infestaciones por parásitos gastrointestinales y pulmonares, así como también para las ectoparasitosis por piojos, sarnas, bernés y garrapatas.

El producto posee un mecanismo de absorción lenta y de eficacia prolongada, que elimina los parásitos indicados y previene nuevas infestaciones por largos períodos (efecto profiláctico).

Espectro de actividad:

• **Parásitos gastrointestinales:** *Haemonchus spp.*; *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*; *Trichostrongylus spp.*; *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia surrnabada*, *Cooperia pectinata*; *Oesophagostomum radiatum*; *Strongyloides papillosus*; *Nematodirus elvetianus*, *Nematodirus spathiger*; *Toxocara vitulorum*; *Trichuris spp.*; *Bunostomum phlebotomum*.

• **Parásitos pulmonares:** *Dictyocaulus viviparus*, *Dictyocaulus filaria*.
Actúa en la profilaxis de las larvas de 3er estadio por un período de entre 5 a 7 semanas.

• **Ectoparásitos:**

Garrapatas: *Boophilus microplus*.
60 a 70 días libres en los cuales las infestaciones por larvas viables serán reducidas en más del 90%. En casos de predios para erradicación contra *Boophilus microplus* se debe tratar cada 60 días.

Bernés: *Dermatobia hominis* (estadios parasitarios).
Más de 125 días de eficacia con una reducción próxima al 90%; *Cochliomya hominivorax*.

Piojos succionadores: *Haematopinus spp.*; *Linognathus vituli*; *Solenoptes capillatus*.

Sarnas causadas por: *Psoroptes spp.*; *Psoroptes ovis*; *Sarcoptes spp.*; *Sarcoptes scabiei* (hasta 60 días de actividad).

Está indicado como ayuda en el control de la población de *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos); como preventivo de la miasis del ombligo en terneros recién nacidos y en las heridas de castración. También ayuda en el control de la Sarna por *Chorioptes bovis*.

USO VETERINARIO

NUEVO

Randon

TITANIUM®

3.15

Parasiticida Interno-Externo

Contenido: **1 Litro**

Fórmula tixotrópica*
Acción prolongada

König

ESPECIES ANIMALES A LAS QUE SE DESTINA: Bovinos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Agitar bien durante un minuto antes de dosificar, manteniendo cierta periodicidad de agitación en el transcurso de las dosificaciones.

Administrar 1 mL. cada 50 kg. de peso vivo por vía subcutánea.

La formulación contiene 3,15% de Ivermectina, lo que proporciona una dosis de 630 mcg. de Ivermectina por kg. de peso vivo.

Intervalo entre dosis:

Entre 5 y 7 semanas contra nematodos gastrointestinales y pulmonares. Entre 70 y 100 días contra garrapatas y bernés. Una sola aplicación es suficiente para combatir infestaciones de sarna Psoróptica; y si fuera necesario repetir a criterio del profesional actuante.

PERÍODO DE CARENIA:

El período de carencia en la carne para consumo es de 122 días. No se aconseja utilizar el producto en bovinos de leche en producción.

En caso de aplicarse en hembras lecheras, se recomienda hacer la última aplicación 122 días antes del parto.

PRECAUCIONES:

Mantener el producto protegido dentro del estuche. Almacenar lejos del alcance de los niños y animales domésticos. Nunca volver a utilizar los envases vacíos. Eliminar envases de acuerdo a legislación vigente.

Conservar en local seco y fresco, protegido de la luz solar, en su envase original bien cerrado.

Reg. M.G.A.P.: A-4745

KÖNIG URUGUAY S.A.

Antonio Machado 1443 - Montevideo - Uruguay
Tel.: 208-3920 - Director Técnico: Dr. Raúl Leites.

direcciontecnicauy@koniglab.com

Fabricado por: Laboratorio habilitado N° 91.

www.koniglab.com

Serie N°:

Elab.: