



eCP estradiol®

Endocrínico Inyectable

ECP ESTRADIOL es un compuesto elaborado a base del éster más potente conocido de estrógenos naturales: el 17 β-ciclopentilpropionato de estradiol (cipionato de estradiol). Provoca una rápida inducción del estro en la mayoría de las especies domésticas, el cual persiste por períodos similares al que ocurre espontáneamente.

INDICACIONES Y DOSIS: Aplicación por vía intramuscular exclusivamente. ECP ESTRADIOL ofrece todas las aplicaciones funcionales de los estrógenos naturales, con la ventaja de una acción más prolongada, uniforme y profunda.

Las aplicaciones en el campo veterinario son las siguientes:
Caninos: Hembras: Falsa preñez: 0,25-0,50 mL /-. Para impedir la implantación del óvulo fecundado en perras recientemente apareadas, cuando es una preñez no deseada: 0,25-0,50 mL /-
 - Tratamiento del anestro o ausencia de período de celo: 0,25-0,50 mL /-
 - Estimulación de la expulsión uterina de restos placentarios, fetos momificados o pus, Piómetra: 0,50-1,00 mL /-
 - Terapia de reemplazo en perras castradas cuando se presenta incontinencia

urinaria: 0,25-0,50 mL. **Machos:** Hipertrofia prostática (inhibe las hormonas sexuales e inactiva la glándula prostática): 0,50-1,00 mL /-
 - Paliativo en el adenoma anal de perros gerontes: 0,125-0,25 mL. **Felinos:** - Anestro en hembras: 0,125-0,25 mL. **Vacas:** - Anestro, en ausencia de quiste folicular: 1,50-2,50 mL /-
 - Expulsión de pus en piómetras: 5,00 mL /-
 - Retención de cuerpo lúteo en vacas lecheras: 2,00 mL /-
 - Expulsión de restos placentarios o fetos momificados: 5,00 mL /-
 - Hidropesía del amnios: 3,00-4,00 mL. Las dosis promedio para vacas pueden repetirse a la semana, si es necesario. **Vaquillonas:** - Anestro, en ausencia de quiste folicular: 1,50 mL. **Yeguas:** - Anestro: 2,50-5,00 mL. **Cerdas y ovejas:** - Anestro: 0,25-0,5 mL.

SOBREDOSIFICACION: Puede manifestarse con períodos de

celo prolongados, desarrollo precoz, irritación genital y reducción de la producción lechera. En caso de observar alguna de estas manifestaciones, reducir la dosificación correspondiente. En perras, si el celo se prolonga excesivamente pueden aplicarse preparados antiestrógenos.

NOTA: Dado que no es posible determinar con exactitud el momento en que ocurre la ovulación en hembras con estro inducido, se aconseja servir las repelidamente durante el celo para favorecer la concepción. En ausencia de folículos normalmente desarrollados puede ocurrir inducción del celo, pero sin ovulación.

PRECAUCIONES: Como con todos los productos hormonales, se deberá efectuar un completo examen del tracto reproductivo

previo a la administración de la droga. La preñez es lo primero que debe descartarse como causa del anestro o de la persistencia del cuerpo lúteo.

Contraindicaciones: En casos de preñez deseada. No debe administrarse en perras durante el estro tardío o en metaestro, ya que se incrementarían las probabilidades de producir endometritis o piometritis. Tumores estrógeno-dependientes.

ADVERTENCIAS: La administración de ECP ESTRADIOL debe efectuarse lo más temprano posible después de producida la fecundación, ya que una vez establecida la implantación de los óvulos fertilizados, el tratamiento no será eficaz.

El uso reiterado o una fuerte sobredosis en perras puede producir anemia gradual con leucocitosis, seguida de leucopenia y

trombocitopenia y finalmente aplasia medular.

La administración de estrógenos, en algunos casos, puede producir quistes foliculares.

En casos de persistencia de cuerpo lúteo provocado por endometritis, se recomienda la aplicación combinada de agentes antimicrobianos apropiados con ECP ESTRADIOL.

Período de restricción en animales productores de carne: 60 días. **Período de restricción en leche:** 60 días

Presentación: Frasco ampolla conteniendo 10 mL.

Comercializado en estuches con 12 unidades.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. **Uruguay:** CIAT. Tel. (02) 1722. **Bolivia:** Acudir al Médico o Centro de

Salud más cercano. **Ecuador:** Ctro. de Control de Venenos. Tel. (04) 256-0300. **El Salvador:** Hospital San Rafael Tel. 2525-5800 ext 148 y 149. **Guatemala:** CIAT Tel. (502) 22513560 - (502) 22320735. **Panamá:** CIMET Tel: (507) 269-2741. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Mac. Tel. (021) 204-532 / 800. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **República Dominicana:** CIDL Tel. (1809) 562-6601 ext. 1301. **Venezuela:** UVV. Tel. (212) 605-2386.

Nota: Por debajo de los 10° C algunos componentes del vehículo sulfidrican. En ese caso, emitir a temperatura adecuada antes de usar. El producto carece de toxicidad a las dosis y formas de administración recomendadas.

El laboratorio no se responsabilizará por las consecuencias que pudieran causar el mal uso que se le diera al producto.



**Endocrínico
Cipionato de estradiol
Inyectable estéril
venta bajo receta archivada
10 mL - Industria Argentina**

Fórmula: 17 β-ciclopentilpropionato de estradiol 0,2g, clobutanol andrógeno 0,5g; excip. oleoso estéril c.s.p. 100mL.
Para aplicación UN, exclusivamente
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Consulte al médico veterinario.
 Conservar entre 4 y 25° C. Venc: dos (2) años a partir de la fecha de elab.
 SENASA Cert. N° 87.118
 Estab. elab. N° 5580



7 791432 022007



Laboratorio

En Argentina: Elaborado y distribuido por **Laboratorios König S.A.**, Av. B. Rivadavia 719, B1666AOL, Avellaneda, Buenos Aires, Tel. (011) 4206-4141, correo: informacion@koning.com.ar, Tel. De Oscar Prieto, M. U. M. U. 9136. Pba. y vec. por: **En Uruguay:** **König Uruguay S.A.**, San Francisco 1195, Montevideo. Tel. (003) 236-3200. Cto. Tec. Dr. Paul Linares, directoriocientifico@koning.com.uy MAP N° 5092. **En Bolivia:** **VETERQUÍMICA BOLIVIANA S.R.L.**, Av. Piza N° 483, Santa Cruz. Tel. (003) 332-0281. Cto. Tec. Ernesto Rojas V. SENASIG CR-PUN N° 3402004. **En Ecuador:** **Ecoquímica C.A.**, Av. Bolívar 1-5 Centro Cuenca y Alfareros, Vía al Tingo, Cuenca, Tel. (022) 861 589. Resp. Lic. Fausto Flores. N° rex. AGRICOLA 00001. **En El Salvador:** **SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S.A.** De C.V. Edificio Acosta, calle 5-41 BUJO, Luis contra. Ste. Elena, Antigua, Guatemala. Tel. (502) 2565-5555/5595. **En Guatemala:** **SUMINISTROS PORQUINOS S.A.** 2° Av. 41-62, zona 12 col. Monte María, Cto. empresarial Monte María, bodega 104, Guatemala. Tel. (502) 24791569 / 24790069. MASA N° rex. **En Honduras:** **IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A.** DE C.V. Residencial Monte Bolívar, Blvd. Casca PAZ San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2585-6941. Mica. Reg. Dr. Roberto Mejía Prieto. Reg. N° 99-4892. **En Panamá:** **CONSTRIVET S.A.** Juan Bosch 10. Tel. 305-2303929. inform@constrivet.net. Resp. Lic. Dra. Emilia Prieto. C.I. 726. M.I.U.A. Reg. N° 99-4408-18. **En Paraguay:** **CRESUR S.A.** Av. J.E. Bogado 1428. RFC (021) 333-407 Reg. SENACSA N° rex. **En Perú:** **GLOBALVET SAC.** Calle Mario Valdivia N° 160 Urb. Maranga San Diego, San Miguel Lurín, Perú. 011) 719-0017. SENASA Reg. N° rex. **En Venezuela:** Reg. **ADALCA, C.A.** RIF. J-30285116-0. Reg. MFCASA N° 100.6397. Tel. (024) 871-8011/7340. Valencia. Ac. Tec. Dr. Carlos Durand M.U. OFE 0201 743397.