

kobra[®] curabicheras • uricida • antimiásico

Venta libre (venta sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario).

Fórmula: Cada 100 g de aerosol contiene:

Cipermetrina (3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de α -ciano-3-fenoxibencilo 0,50 g %; DDVP (fosfato de O, O-dimetil-O-(2,2) diclorovinilo 0,49 g %.

Indicaciones: Kobra[®] antimiásico preventivo y curativo. Combate las miasis causadas por las larvas de dípteros, tales como Dermatobia hominis. Tratamiento y prevención de bicheras en intervenciones quirúrgicas como castración, descole, descorme, ombligo de los terneros, rajaduras de casco, heridas de cualquier origen. Heridas en general.

Especies: Bovinos, Ovinos, Equinos, Caprinos y Porcinos.

Modo de aplicación: Uso externo. Agitar varias veces el envase antes de aplicar. Rociar en forma abundante la herida o bichera, desde una distancia de 10-15 cm, de manera de facilitar la penetración dentro de las heridas y bordes. En caninos rociar formando un halo en todo el borde de la herida, sin que el producto tenga contacto con el interior de la misma. Repetir la aplicación según criterio del profesional actuante. El número de aplicaciones como preventivo depende del tipo de herida y de las condiciones ambientales pero se recomienda en el caso de bicheras de ombligo, una sola aplicación dentro de las 24 horas del nacimiento. En el caso de heridas de castración se recomiendan 2 aplicaciones separadas por 72 horas.

Contraindicaciones: No aplicar en aves ni en felinos.

Precauciones: Producto tóxico. No fumar, comer ni beber durante su aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Lavarse las manos luego de su uso. No arrojarse el envase al fuego. No perforar ni rellenar el envase. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar profundamente con agua durante 15 min. y consultar al médico.

Síntomas de intoxicación: Exitación, náuseas, vómitos, diarreas, sudoración y miosis. Llamar inmediatamente al médico o al centro toxicológico.

Antídoto: Del compuesto organofosforado (DDVP): 1-2 mL de sulfato de atropina al 1% vía intramuscular. Cipermetrina: aplicar tratamiento sintomático.

Centros Toxicológicos: Argentina: Centro Nac. de Intox. 0800-333-0160; Hosp. de Clínicas (UBA) 5950-8804. Bolivia: Llamar o acudir al médico. Ecuador: Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. Honduras: Llamar o acudir al médico. Panamá: CIMET Tel: (507) 269-2741. Perú: CICOTOX Tel. 0800-1-3040. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586. Paraguay: Ctro. Toxicológico Nac. Tel: (021) 204-800/532.

Nota: El Laboratorio no se responsabiliza por las consecuencias que pudiera causar el uso inadecuado del producto.

Tiempo de espera: En Argentina: Pre-faena: 6 días. Para la leche con destino al consumo humano: 6 horas (*Resolución SENASA N° 1.343/93*).

Conservar entre 4°C y 35°C

Serie, Elaboración y Vencimiento: Ver fondo del envase.

Establecimiento Fraccionador: Ver fondo del envase.

Vencimiento: 3 años a partir de la fecha de elab.

En Argentina:

■ SENASA Cert. N°: 06-327
■ Estab. elab. N°: 8.596

Elaborado y distribuido por **LABORATORIOS KÖNIG S.A.** Av. B. Rivadavia 719. B1868A0A. Avellaneda, Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141. consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario. M.N. 3136. En Uruguay: MGAP N° A 3940. Imp. y dist. por **KÖNIG URUGUAY S.A.** San Fructuoso 1169, Montevideo. Tel. (02) 208-3920. Dir. Téc. Dr. Raúl Leites. direcciontecnica@koniglab.com. En Bolivia: SENASAG N° 4768/11. Imp. y dist. por **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Av. Píral N° 493, Santa Cruz. TEL: (03) 352-0261 Dir. Téc. Ernesto Rojas V. En Ecuador: N° xxx AGRICULTIDAD. Imp. y dist. por **ECUQUIMICA C.A.** Av. Iliad Km 1,5 entre Cisnes y Alondras, Vía al Tingo, Quito, Tel. 022 861 690. Resp. Téc. Dr. Fausto Yáñez. En Honduras: Comercio y dist. **IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A.** DE C.V. Residencial Monte Baldo, Bl.43 casa #24 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00604) 2565-8847. Méd. Reg.: Dr. Abelardo Mejía Pineda. En Panamá: M.I.D.A. Reg. N° RF-4473-09. Imp. y dist. por **DISTRIVET S.A.**, Juan Díaz calle 1b, Tel. 007-2205821. distribvet@cableonda.net Resp. Téc.: Dra. Enilda Pinto ID. 728. En Paraguay: Imp. por **CRÉSUR S.A.** Av. J.F. Bogado 1428 ATC (021)333-407-Reg. SENACSA N° xxx. En Perú: SENASA Reg. N° F.87.30.1.0017 Comercio por **Globelvet SAG** Calle Mario Valdivia Nro. 180 Urb. Maranga, 3ra Etapa San Miguel - Lima- Perú Central: (511) 719-0377. En República Dominicana: Ministerio de Agricultura. Dist. **FLEXEMPAQUES SRL** RD#... Calle 16 de Agosto N°1. Los pepines, Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana. Tel. (809) 241-3095/233-3222. En Venezuela: Imp. por **REPRESENTACIONES ADALCA, C.A.** RIF: J-30295110-0. Reg. MAT SASA N° xxx. Tel.: 0241-871-6071/7340, Valencia. As. Téc. Dr. Carlos Durand M.V. CPE...

Kobra[®]

curabicheras • uricida • antimiásico

Agite antes de usar


SPRAY TOPICO
Con válvula multidireccional

- Preventivo y curativo de miasis
- Heridas externas en general

USO VETERINARIO

ATENCIÓN LEA EL ROTULO
Industria Argentina

Peso Neto: 250g
Contenido: 440ml.



V4



König

