

# kuramicina L.A.<sup>®</sup>

## Oxitetraciclina (como clorhidrato) Antibiótico en solución inyectable

uso veterinario

Venta bajo receta

KURAMICINA es una **solución de acción prolongada del antibiótico oxitetraciclina, de amplio espectro**. Dada su especial formulación y concentración, KURAMICINA provee **niveles terapéuticos de droga por 3 a 5 días**, facilitando el tratamiento de los animales.

Se presenta en **solución estable lista para su uso**.

### INDICACIONES:

KURAMICINA está indicado como **preventivo y curativo** en procesos infecciosos causados por un amplio espectro bacteriano de gérmenes Gram positivos y Gram negativos, así como en los producidos por micoplasmas, rickettsias, clamydias del grupo linfogranuloma-psitacosis, algunos protozoos y hongos patógenos. Su uso está indicado en bovinos, porcinos y ovinos.

**Para su uso preventivo se recomienda el tratamiento de todos los animales del grupo en que se declaró la enfermedad. Su omisión es la causa principal de los fracasos de esta terapia.**

Las principales indicaciones son las siguientes:

- Fiebre del transporte en bovinos y ovinos.
- Diarrea del lechón lactante (colibacilosis).
- Infecciones post-partum.
- Infecciones desencadenadas por hacinamiento o stress.
- Rininitis atrófica del cerdo.
- Síndrome Metritis-Mastitis-Agaláctica de la cerda (aplicar al comienzo del parto).
- Anaplasmosis.
- Leptospirosis.
- Carbuñclo sintomático.
- Neumonías, enteritis, heridas infectadas y otras infecciones inespecíficas.

### VIAS DE APLICACION:

KURAMICINA se aplica por vía intramuscular, en las grandes masas carnosas: tabla del cuello, nalgas, etc. En lechones de hasta 10 kg de peso puede aplicarse por vía subcutánea detrás del pabellón de la oreja.

**Según el volumen total a administrar, la aplicación debe realizarse en dos o más puntos de inyección no superando en ningún caso los volúmenes siguientes en cada punto:**

- **Bovinos: hasta 20 mL por punto de aplicación.**
- **Ovinos: hasta 5 mL por punto de aplicación.**
- **Porcinos: hasta 10 mL por punto de aplicación.**

### DOSIS:

La dosis indicada es de **1 mL cada 10 kg de peso**, para todas las especies (200 mg de oxitetraciclina 10 kg de peso). En lechones de menos de 10 kg de peso la dosis es de 1 mL por animal.

### FRECUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS:

Tanto para los tratamientos preventivos como curativos, la frecuencia indicada es de **una sola aplicación**, salvo que la afección sea lo suficientemente grave como para ameritar una segunda aplicación a los 3 a 5 días.

Se recomienda una segunda aplicación en los siguientes casos:

- Anaplasmosis: repetir a los 7 días.
- Síndrome Metritis-Mastitis-Agaláctica de la cerda: repetir a los 4 días.

### ADVERTENCIAS:

Pueden producirse reacciones inflamatorias pequeñas en el punto de inyección a los 2 a 4 días, siendo más frecuente en animales de menos de 100 kg. Excepcionalmente en animales hipersensitivos pueden producirse reacciones alérgicas o anafilácticas. Ante los primeros síntomas, suspender el tratamiento y administrar epinefrina. Puede presentarse hemoglobinuria transitoria sin significación clínica.

Suspender el tratamiento en animales destinados al consumo de carne 28 días antes del sacrificio.

No deberá administrarse a animales en producción de leche que se destine a consumo humano con o sin industrialización previa.

### Mantener fuera del alcance de los niños.

**Centros Toxicológicos:** **Argentina:** Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Ecuador:** Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-800/532. **Republica Dominicana:** CIDI. Tel: (1809) 562-6601 ext. 1801. **Panamá:** CIMET Tel: (507) 269-2741.

### CONTRAINDICACIONES:

No aplicar en animales alérgicos a la oxitetraciclina.

No administrar penicilinas concomitantemente.

**Período de retiro:** Suspender el tratamiento en animales destinados al consumo de carne 28 días antes del sacrificio.

No deberá administrarse a animales en producción de leche que se destine a consumo humano con o sin industrialización previa.

**FORMULA:** Oxitetraciclina como base de Clorhidrato 20,00g% P/V, excipientes c.s.p. 100 mL.

**PRESENTACION:** Frasco ampolla de 40, 100 y 250 mL.

**Nota:** El laboratorio no se hará responsable del mal uso que pudiera dársele al producto. Su uso debe estar controlado por un médico veterinario. La aparición de una ligera opalescencia en la solución no implica una disminución en la potencia de la misma.

### Conservar entre 4 y 30° C

En Argentina:

■ SENASA. Cert. N° 89.184

■ Estab. Elab. N° 5580

Industria Argentina



En Argentina: Elaborado y distribuido por **Laboratorios König S.A.** Av. B. Rivadavia 719, B1868A0A, Avellaneda, Buenos Aires, Tel. (011) 4208-4141, consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario, M.N. 3136.

En Uruguay: MGAP N° A 443. Importado y distribuido por **König Uruguay S.A.** San Fructuoso 1169, Montevideo.

Tel. (02) 208-3920 direcciontecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Raúl Leites.

En Bolivia: SENASAG CR-PUV N° 658/2005. Importado y distribuido por **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.**

Av. Píral N° 493, Santa Cruz, TEL: (03) 352-0261, Dir. Téc. Ernesto Rojas V.

En Ecuador: AGRICOLAIDAO N° 204-9686. Importado y distribuido por **Ecuaguimica C.A.**

Av. Ilafo Km 1.5 entre Cisnes y Alondras, Vía al Tingo, Quito, Tel. 022 861 690, Resp Técnico Dr. Fausto Yáñez.

En Honduras: comercializa y distribuye **IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.** Residencial Monte Bello, BL 43 casa

#34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2565-6847, Med. Reg. Dr. Abelardo Mejía Pineda, Reg. N°: PF-4913.

En Panamá: M.L.D.A. Reg. N° xxx Importado y distribuido por **DISTRIVET S.A.**, Juan Díaz calle 1b, Tel. 507-2205821.

distrivet@cablenoda.net Responsable técnico: Dra. Enilda Pinto ID. 728.

En Paraguay: Importado por **CRESUR S.A.** Av. J.J. Bogado 1428 ATC(021) 333-407, Reg. SENACSA N° 5.239

En Perú: Reg. N° xxx Comercializado por **GLOBAL VET S.A.C.** Calle Mario Valdivia N° 180 Urb. Maranga 3ra Etapa,

San Miguel, Lima, Perú, (511) 719-0377.

En Venezuela: Importado por **Representaciones ADALCA, C.A.** Rif: J-30295110-0, Reg. MAT SASA N° M.L. 6.959.

Tel. 0241-871-6071 / 871-7340, Valencia, Asesor Técnico Dr. Carlos Durand M.V, CPE1207143802 40 mL.,

CPE1207143803 100 mL., CPE1207143804 250 mL.,

www.koniglab.com