

Uso veterinario

# Aplonal® 5%

(Flunixin meglumina)

**Antiinflamatorio - Analgésico - Antipirético  
Inyectable estéril**

El principio activo de APLONAL 5% es el flunixin meglumina, droga que posee acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética, no esteroide, no narcótica. La potente acción antiprostaglandina la convierte en la droga de elección para el alivio del cólico equino, siendo 4 veces más potente que la fenilbutazona. APLONAL 5% puede utilizarse además en caninos.

## INDICACIONES Y USOS:

**Equinos:** • Alivio del dolor asociado a lesiones inflamatorias del aparato locomotor: miositis, artritis, osteitis, tendinitis, sinovitis, etc.; • Alivio del dolor visceral en cólicos.

**Caninos:** • Cuadros inflamatorios abdominales agudos; • Shock endotóxico.

APLONAL 5% está indicado además, para el alivio del dolor post-quirúrgico en las especies mencionadas.

## VIAS DE ADMINISTRACION Y DOSIS:

**Equinos:** En caso de lesiones inflamatorias del aparato locomotor, la dosis a aplicar es de 1,1 mg/kg de flunixin por día (1 mL de APLONAL 5% cada 45 kg de peso) por vía intramuscular o endovenosa. La duración del tratamiento es de 5 días, aunque suelen obtenerse los resultados deseados en un período menor. La respuesta comienza a las dos horas de la inyección intramuscular, siendo máxima entre las 12 y 16 horas post-inyección. La duración del efecto es de 24 a 36 horas.

En caso de cólico APLONAL 5% está indicado por vía endovenosa a la dosis anteriormente mencionada. En más del 90% de los casos el dolor desaparece dentro de los 15 minutos luego de la inyección. Si el dolor persiste o reaparece, el tratamiento puede repetirse hasta 3 veces a intervalos de 30 minutos.

**Caninos:** Administrar 1 mg/kg de flunixin (0,2 mL de APLONAL 5% cada 10 kg de peso) por vía intramuscular o endovenosa, cada 24 horas, máximo 3 aplicaciones.

**CONTRAINDICACIONES:** No administrar a caninos con trastornos digestivos o insuficiencia renal.

No administrar a caninos con perfusión renal disminuída (deshidratación, hipotensión, etc.)

Evitar la asociación con sustancias que presenten toxicidad gastrointestinal o renal.

No administrar a animales menores de 3 días de edad.

**PRECAUCIONES:** No se ha determinado el efecto de APLONAL 5% en hembras preñadas, por lo que debe evitarse su uso o utilizarlo con precaución.

Debe evitarse la inyección intraarterial de APLONAL 5%, ya que puede causar reacciones adversas. Dichas reacciones incluyen: ataxia, incoordinación, debilidad muscular y excitación, pero son fugaces y desaparecen sin necesidad de medicación.

Debe evitarse el uso concomitante con corticosteroides y otros antiinflamatorios no esteroides.

No administrar a equinos destinados a consumo alimentario humano

**FORMULA:** Cada mL contiene:

Flunixin meglumina, 83 mg (equivalente a 50 mg de flunixin base); vehículo, c.s.p.

**PRESENTACION:** Frascos ampolla conteniendo 12 mL y 30 mL.

**Conservar entre 4 y 35° C.**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**En Venezuela:** Venta Bajo Prescripción del Medico Veterinario.

**En Venezuela:** Manténgase fuera del alcance de los niños.

**Centros Toxicológicos:** **Argentina:** Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Ecuador:** Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204- 800/532. **República Dominicana:** CIDI. Tel: (1809) 562-6601 ext. 1801. **Panamá:** CIMET Tel: (507) 269-2741.

**En Argentina:**

■ SENASA Cert. N° 98170

■ Estab. Elab. N° 5.580

Importado y distribuido en: Ver estuche.

 **König**  
www.koniglab.com

PA 9011-V3