

**Indicaciones:** Tratamiento preventivo y curativo de bicheras en todo tipo de heridas en las especies canina, bovina, equina, ovina, caprina y porcina; con propiedades larvicidas, antimicrobianas, hemostáticas y cicatrizantes. Forma una película protectora que elimina el sangrado. Previene la miasis en los trabajos de rutina (cirugía, ombligo, descole, descorne) gracias a su poder repelente. BACTROVET® PLATA AM es eficaz frente a bacterias *Gram* positivas y *Gram* negativas sensibles a la sulfadiazina argéntica y larvas de moscas productoras de miasis: *Lucilia* sp.; *Calliphora* sp.; *Callitroga* sp. y *Sarcophaga* sp.

**Contraindicaciones:** No aplicar en gatos. No usar en animales debilitados. No aplicar a caninos de menos de 2 meses de edad.

**Aplicación:** Agitar varias veces el envase antes de aplicar. Colocar el envase a 10 cm del área a tratar y rociar uniformemente, asegurando la penetración del producto dentro de la herida. Aplicar también alrededor de la misma, formando un halo de 5 cm. En caso de bicheras profundas es necesario asegurarse la penetración del producto en las cavidades. El color plateado de la herida permite determinar que animal ha sido tratado. En caso de miasis la aplicación se puede repetir diariamente hasta la curación. La duración del tratamiento depende del tipo de afección y de la complicación de la herida, se recomienda continuar la aplicación hasta lograr la cicatrización. El número de aplicaciones a realizar como preventivo dependen del tipo de herida y de las condiciones ambientales. En la prevención de las bicheras del ombligo basta con una sola aplicación dentro de las 24 horas del nacimiento. En caso de herida de castración en grandes animales se recomiendan dos aplicaciones separadas por 72 horas.

**Fórmula:** Cada 100 g de concentrado contiene: Sulfadiazina de plata 0,10 g %; Aluminio 5,00 g %; D.D.V.P 1,60 g %; Cipermetrina al 50% 0,40 g %; Propelente: Butano. Relación concentrado/propelente: 22/78 p/p.

**NUEVO**



USO VETERINARIO

# bactrovet® plata AM pet König

POLVO CICATRIZANTE  
EN AEROSOL

CON LAMINA  
PROTECTORA

ALTA ADHERENCIA

Venta Libre (Venta sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario)

- Antimiásico
- Repelente
- Bactericida
- Epitelizador
- Hemostático
- Ideal para:
  - Punta oreja
  - Afecciones interdigitales
  - Dermatitis por lamido



EXCLUSIVA VALVULA  
MULTIDIRECCIONAL  
QUE FACILITA EL  
MANEJO DEL ANIMAL

Peso neto **146g/9oz**

Contenido **250mL**

Industria Argentina



**Recomendaciones:** Producto tóxico. No fumar, comer ni beber durante su uso. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Lavarse las manos después de su aplicación. Efectuar la aplicación en favor del viento para que no afecte al operador. Agitar varias veces el envase antes de aplicar. No arrojar el envase al fuego. No rellenar el envase. Si el producto contacta con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos deben lavarse profundamente con agua durante por lo menos 15 minutos y luego consultar al médico.

**Síntomas de intoxicación:** Excitación, náuseas, vómitos, diarreas, sudoración, miosis.

**Antídoto:** Para el compuesto organofosforado DDVP el antídoto es el sulfato de atropina al 1% vía intramuscular. Repetir hasta remisión de los síntomas. La cipermetrina carece de antídoto específico conocido. Si los síntomas difieren de los mencionados se deberá instaurar tratamiento sintomático.

**Centros Toxicológicos:** Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0180. Bolivia: Llamar o acudir al médico. Ecuador: Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-8300. Guatemala: CNAV Tel. (02) 225-1580. Honduras: Llamar o acudir al médico. México: CINET Tel. (507) 265-2741. Paraguay: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 220-418 (en int.). Perú: CICOTOX Tel. 0800-1304. República Dominicana: CIDL Tel. (1809) 682-4901 ext. 1801. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. Venezuela: UCY Tel. (02) 605-2586.

Conservar entre 4 y 35°C

En Argentina:

SENASA Crt. N° 86.463  
Estab. fab. N° 6.596  
Elaborado y distribuido por Laboratorios König S.A. Av. B. Rivadavia 719 888AOL. Avellaneda, Buenos Aires, Tel. (011) 426-4141. Dir. Tec. Dr. Oscar Horlas, Médico Veterinario. MUN. 3136. [consaltec@koniglab.com](mailto:consaltec@koniglab.com). En Uruguay: MGAP N° 4.746. Imp. y dist. por König Uruguay S.A. San Francisco 1189, Montevideo. Tel. (02) 236-3620. [directores@koniglab.com](mailto:directores@koniglab.com). Dir. Tec. Dr. Raúl Liles. En Bolivia: SENASAG CR-PUV N° 850/2005. Imp. y dist. por VETEROMICA BOLIVIANA S.R.L., Av. Piraí N° 493, Santa Cruz. Tel. (03) 352-0261. Dir. Tec. Ernesto Rojas V. En Ecuador: N° Reg. 383-281-4654-AGROCALIDAD. Imp. y dist. por Ecuaquímica C.A. Av. Iloilo Km 1,5 entre Cenes y Alondra, Vía al Tiingo, Quito. Tel. 022 691 693. Resp. Tec. Dr. Fausto Yáñez. En Guatemala: SUMINISTROS PORCINOS, S.A. 31. Av. 44-80 zona 12 cd. Monte María I. Centro empresarial Monte María, Bodega 104, Guatemala. Tel. (502) 2479 1568 / 2479 006. Reg. MAGA N° xxx. En Honduras: Comerc. y dist. IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.R. Residencial Monte Bello, 643 casa #3 San Pedro Sula, Honduras. C.A. Tel. (0224) 2505-8467. Med. Resp. Dr. Roderick Nolas Pineda. Reg. N° PR-4521. En Panamá: M.L.D.A. Reg. N° RF-4368-08. Imp. y dist. por DISTRIVET S.A., Juan Díaz Calle 1b. Tel. 507-2205821. [distrib@cablonet.net](mailto:distrib@cablonet.net) Resp. Usc. Dra. Eridia Pinto ID: 726. En Paraguay: Imp. por CREBUS S.A. Av. J.F. Bogado 1428. ATC (021) 333-4477. Reg. SENASAG N° 5.222. En Perú: SENASA Reg. N° F-27.30.10/05. Importado y Distribuido por Globalvet SAC Calle Mario Valdivia No. 180 Urb. Maranga, 3ra Etapa San Miguel, Lima. Contact. (51) 719-0377. En República Dominicana: Ministerio de Agricultura, Dist. FLEXEMPAQUES SRL R.D.A., Calle 16 de Agosto N° 1. Los pines, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo. Tel. (809) 24-3065 / 253-3222. En Venezuela: Importado y Distribuido por Representaciones Adica, C.A. R.F. J-302611040. Registro N° 7.031. Tel. 0041-871-607-1173-40. Valencia, Ar. Tec. Dr. Carlos Duvald M.V. OPE 1007140278.

En Venezuela: Venta Bajo Prescripción al Médico Veterinario. En Venezuela: Manténgase fuera del alcance de los niños. Vencimiento: 3 años a partir de la fecha de elaboración. Lote, elaboración y vencimiento: Ver fondo del envase. Establecimiento fraccionador: Ver fondo del envase.

**König**  
[www.koniglab.com](http://www.koniglab.com)



AGITE BIEN ANTES DE USAR

