



# cestodan®

Tenicida de amplio espectro  
para perros y gatos

uso veterinario


Venta bajo receta

CESTODAN es el más eficaz y seguro tenicida de amplio espectro, de una sola toma, para perros y gatos.

## INDICACIONES:

Cestodan está indicado para el tratamiento de infestaciones por *Echinococcus granulosus* (agente de la hidatidosis humana), *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *Taenia taeniaeformis*, *Taenia ovis*, *Taenia hidatigena*, *Taenia multiceps* y demás especies de tenias (gusanos chatos); tanto en sus estadios maduros e inmaduros.

## CICLO DE LA ENFERMEDAD HIDATIDICA:



## ADMINISTRACION Y DOSIS:

Los comprimidos pueden administrarse solos o mezclados con el alimento, en este caso asegurarse la ingestión a través de la supervisión.

No es necesario que el animal esté en ayuno ni previo ni posterior a la administración.

Administrar 1 comprimido cada 5kg de peso.

Una sola toma es suficiente para lograr la desparasitación del animal. Debido al serio riesgo para la salud pública resulta particularmente importante repetir los tratamientos de cada 30 a 45 días de las regiones donde la hidatidosis es una enfermedad endémica. En los casos de infestación por *Dypilidium caninum*, donde el huésped intermediario es la pulga, la reinfestación se mantendrá si no se elimina el ectoparásito del animal y su entorno.

## Mantener fuera del alcance de los niños.

## MARGEN DE SEGURIDAD:

Cestodan posee un amplio margen de seguridad. Dosis 5 veces superiores a la recomendada, administradas a intervalos de 14 días en perros de 4 semanas de edad, no produjeron ningún signo de toxicidad. Los signos en casos de sobredosis pueden incluir vómitos, salivación, diarrea y depresión.

Cestodan puede suministrarse en forma segura a hembras preñadas ya que no produce efectos adversos.

**CONTRAINDICACIONES:** El producto no deberá utilizarse en cachorros de menos de 4 semanas de edad, ni en gatitos menores de 6 semanas de edad.

**FORMULA:** Cada comprimido contiene: praziquantel (2 (ciclohexilcarbonyl)-1,2,3,6,7-11b-hexahidro-4H-pirazino [2,1-a]isoquinolina-4-ona 25mg; excipientes c.s.p 300mg.

**PRESENTACION:** Envase con 4 comprimidos.

**Centros Toxicológicos:** **Argentina:** Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Ecuador:** Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel: (021) 204-800/532. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.

■ SENASA Certificado N°: 85.186  
■ Estab. elab. N°: 5580

Industria Argentina

**En Uruguay:** MGAP N° 4.568. Imp. y dist. por **KÖNIG URUGUAY S.A.** Antonio Machado 1443, Montevideo. Tel. (02) 208-3920.direcciontecnica@koniglab.com / **En Bolivia:** SENASAG CR-PUV N° xxx. Imp. y dist. por **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Av. Pirai N° 493, Santa Cruz. TEL: (03) 352-0261 Dir. Tec.: Ernesto Rojas V. / **En Ecuador:** Cert. N°xxx-AGROCALIDAD. Imp. y dist. por **ECUAQUIMICA C.A.** Av. J.S. Castillo y J. Tanca Marengo, Guayaquil. Tel. (04) 268-2050 / **En Honduras:** Comerc. y dist. **IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.** Residencial Monte Bello, Bl.43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2565-6847. Médico Regente: Dr. Abelardo Mejía Pineda. / **En Paraguay:** Imp. por **CRESUR S.A.** Av. J.F. Bogado 1428 ATC (021) 333-407 - Reg. SENACSA N° xxx / **En Venezuela:** Imp. por **REPRESENTACIONES ADALCA, C.A.** Rif: J-30295110-0. Reg. MAT SASA N° M.I. 6.960. Tel.: 0241-871-60-71/871-73-40, Valencia.



Elaborado y distribuido por **Laboratorios König S.A.** Av. B. Rivadavia 719 (B1868AOA) Avellaneda, Buenos Aires - Tel.: (011) 4208-4141 - E-mail: consultatecnica@koniglab.com