

Serie Nº

Elaboración



USO VETERINARIO

# diafin<sup>®</sup> 2 König

Antidiarreico  
inyectable

Venta bajo receta

Contenido: 20 mL Industria Argentina



# diafin<sup>®</sup> 2

## Antidiarreico y modulador de la función intestinal inyectable

www.koniglab.com

DIAFIN 2 inyectable es un anticolinérgico no convencional a base de benctimida, cuyas propiedades fundamentales consisten en:

- Regulación de la motilidad intestinal (inhibición del peristaltismo).
- Acción antideshidratante, por inhibición de las excreciones o secreciones de fluidos al lumen intestinal.
- Carencia de efectos colaterales de origen central y amplio margen de seguridad.

Estos efectos se basan en un mecanismo competitivo con la acetilcolina, bloqueando sus receptores específicos a nivel intestinal, previniendo así los efectos peristálticos y secretores, e indirectamente, suspendiendo las deposiciones diarreicas. La ventaja sobre otras drogas anticolinérgicas

(atropina, buscapina y otros derivados) radica, como ya se mencionó, en la ausencia de manifestaciones secundarias de origen central, que usualmente acompañan a estas últimas (midriasis, taquicardia, sequedad de mucosas, broncodilatación). La droga se desbloquea gradualmente a partir de las 48-72 hs. de administración. Este prolongado efecto post-inyección representa una ventaja adicional de suma importancia práctica para facilitar su manejo.

**INDICACIONES:** Prevención y tratamiento de diarreas de origen nervioso (encierro, movimientos de hacienda, arrees, transportes, etc.) o funcionales (cambios de alimentación, pastoreo de verdes, destetes, etc.) en grandes animales. Co-tratamiento sintomático de diarreas bacteria-

nas o víricas en la mayoría de las especies domésticas: bovinos, ovinos, equinos, porcinos y caninos. En estos casos es compatible con la administración simultánea de antibióticos.

### ADMINISTRACION Y DOSIS:

Diarreas bacterianas o víricas:

- Bovinos y ovinos:** 1 mL/10 kg por vía s.c. (p/bovinos de + de 200 kg 20 mL como máx.)
- Equinos:** 0,75-1 mL/10 kg por vía s.c. ó i.m.
- Porcinos:** 1,0 mL/10 kg por vía s.c.
- Caninos:** 1 mL/10 kg por vía s.c.

Estas dosis deberán ajustarse de acuerdo a la gravedad del cuadro. Repetir a las 48 hs. de ser necesario.

**Preventivo:** Administrar 1 hora antes del stress al que se someterá a los animales (transportes,

encierros, pastoreo en verdes, etc.). Las dosis son la mitad de las indicadas como curativas. De ser necesario, aplicar un 2º tratamiento a los 3-4 días, o según criterio del médico veterinario. NORMALMENTE UNA SOLA APLICACION ES SUFICIENTE PARA EL CONTROL O PREVENCION DE LAS DIARREAS.

**CONTRAINDICACIONES:** Timpanismo, empaste, parálisis ruminal, ileo paralítico, constipación. Glaucoma e hiperplasia prostática en caninos.

**ADVERTENCIAS:** En animales destinados al consumo humano y productos de ordeñe para el mismo fin, dejar transcurrir 7 días desde el último tratamiento hasta el sacrificio, y descartar la leche obtenida en ese lapso.

**PRESENTACION:** Frasco ampolla por 20 mL.

Conservar entre 4 y 35° C.

**Mantener fuera del alcance de los niños. En Venezuela:**

la: Venta Bajo Prescripción del Médico Veterinario. **En Venezuela:** Manténgase fuera del alcance de los niños **Centros Toxicológicos:** Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. Bolivia: Llamar o acudir al médico. Ecuador: Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. Honduras: Llamar o acudir al médico. Panamá: CIMET Tel: (507) 269-2741. Paraguay: Ctro. Toxicológico Nac. Tel: (021) 204-800/532. Perú: CI-COTOX Tel. 0800-1-3040. República Dominicana: CIDL Tel: (1809) 562-6601 ext. 1801. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586. Importado y distribuido por: **En Uruguay:** König Uruguay S.A. San Fructuoso 1169, Montevideo. Tel. (02) 208-3920 direccion@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Raúl Leitens MGAP Nº xxx. **En Bolivia:** VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. Av. Pirai Nº 493, Santa Cruz. Tel: (03) 352-0261 Dir. Tec. Ernesto Rojas V. SENASAG CR-PUV Nº xxx. **En Ecua-**

**dor:** Ecuquímica C.A. Av. J.S. Castillo y J. Tanca Marengo. Guayaquil, Tel. (04) 268-2050 Dir. Téc. Dr. Fausto Yánez. Cert. Nº xxx-AGROCALIDAD. **En Honduras:** IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V. Res. Monte Bello, Bl.43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras. C.A. Tel. (00504) 2565-6847. Med. Reg. Dr. Abelardo Mejía Pineda. **En Panamá:** DISTRIVET S.A., Juan Díaz calle 1b, Tel. 507-2205821, distribvet@cableonda.net Resp. téc.: Dra. Enilda Pinto ID. 728. M.L.D.A. Reg. Nº xxx. **En Paraguay:** CRESUR S.A. Av. J.F. Bogado 1428 ATC (021) 333-407. Reg. SENACSA Nº 5.230. **En Perú:** VETNOVA S.A. Alameda del corregidor 2720 Urb. La Capilla-La Molina, Lima, Perú. Tel. 3657625 SENASA Reg. Nº xxx. **En República Dominicana:** Ministerio de Agricultura. FLEXEMPAQUES SRL RD#.. Calle 16 de Agosto Nº1, Los pepines, Santiago de los Caballeros, Santiago. Tel: (809) 241-3095/233-3222. **En Venezuela:** Representaciones ADALCA, C.A. Rif: J-30295110-0. Reg. Nº 7.021. Tel: 0241-871-6071/7340, Valencia. As. Téc. Dr. Carlos Durand M.V. CPE 1207143785.

**Fórmula:** Clorhidrato de benctimida 0,0165 g (equivalente a 0,015 g de benctimida base), excip. c.s.p. 100 mL.



7191432021819

### En Argentina:

- SENASA Cert. Nº: 89.312
- Estab. elab. Nº: 5580

Elaborado y distribuido por  
**Laboratorios König S.A.**  
Av. B. Rivadavia 719, B1868A0A,  
Avenida, Buenos Aires.  
Tel. (011) 4208-4141.  
consultatecnica@koniglab.com  
Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas,  
Médico Veterinario, M.N. 3136.

**Vencimiento:** 2 años a partir de la fecha de elaboración.

OH91614-V5



TIRE