

Fauna®

Uso veterinario
Venta libre
(venta sin receta en locales
con asesoramiento
profesional veterinario)
Cont. neto 80 g
Industria Argentina



JABON DE
BELLEZA
Antiparasitario
externo

Fauna®

MODO DE USO: mojar el pelo del animal con agua tibia y frotar en forma continua con el jabón FAUNA hasta obtener abundante espuma. Dejar actuar 3 a 5 minutos y enjuagar. Repetir la operación. En caso de infestaciones por pulgas y garrapatas utilizar semanalmente. Para el

tratamiento de la sarna demodéctica se recomienda efectuar baños cada 7 días durante 2 meses, como mínimo. En sarna sarcóptica el intervalo entre baños deberá ser de 4 días y la duración dependerá de la gravedad del cuadro, como orientación 15 a 20 días.

Fauna®

INDICACIONES: baño periódico de caninos y felinos, tanto para pieles sanas como con problemas. FAUNA posee acción pulgicida; garrapaticida; antisárnica (sarna sarcóptica y demodéctica) y piojicida. Es antiseborreico;

antiséptico y queratolítico, eliminando así el prurito y el olor desagradable.

FORMULA: amitraz (1,5-di-(2,4 dimetil fenil)-3 metil-1,3,5-triaza-penta 1,4-dieno), 0,125 g; azufre, 2g; excipientes c.s.p. 100 g.

PRECAUCIONES: No ingerir. No inhalar. Manejar con cuidado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Consulte al médico veterinario. No almacenar junto con alimentos o medicamentos. En caso de ingestión llamar al médico. Aplicar tratamiento sintomático.

No existen contraindicaciones ni limitaciones de uso dado que a la concentración y modo de empleo no produce daños en los animales ni en las personas que lo manipulan. La seguridad reproductiva aún no se ha establecido. Usar solamente cuando los beneficios de la terapia sean superiores a los potenciales riesgos. No está recomendado usar en animales menores de 4 meses de edad ni en los casos que existan lesiones dermatológicas extensas: sarna sarcóptica o demodéctica generalizada. No administrar en forma paralela con otros anticolinérgicos. Está contraindicado en animales diabéticos, con problemas cardíacos e hipotérmicos. En caso de contaminación de la piel con el producto puro, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua durante 15 minutos. Los gatos son más sensibles a la intoxicación por amitraz que los perros.

Síntomas de intoxicación: vómitos, depresión del sistema nervioso central y de la respiración, bradicardia, hipotensión, hipotermia, hiperglucemia, convulsiones.

Antídotos del amitraz: Yohimbina 0,11-0,2 mg/Kg. EV. El tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento. Atipamezol también ha sido utilizado para tratar la intoxicación con amitraz.

Centros Toxicológicos: Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. Bolivia: Llamar o acudir al médico. Ecuador: Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. El Salvador: Hospital San Rafael tel. 2525-5800 ext 148 y 149. Guatemala: CIAT Tel. (502)22513560. (502)22320735. Honduras: Llamar o acudir al médico. Panamá: CIMET Tel. (507) 269-2741. Perú: CICOTOX Tel. 0800-13040. Paraguay: Ctro. Nac. de toxicología 220-418, 204-900 (int. 1011). República Dominicana: CIDN. Tel. (1809)562-6601 ext. 1801. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586.

Conservar entre 4 y 35° C. Vencimiento: 3 (tres) años a partir de la fecha de elaboración. En Venezuela: Venta Bajo Prescripción del Médico Veterinario. En Venezuela: Manténgase fuera del alcance de los niños

En Argentina:

SENASAS, Cnt. N° 86.120
Estab. Elab. N° 8.596

Elaborado y distribuido por **LABORATORIOS KÖNIG S.A.**, Av. B. Rivadavia 719, B1868A0A, Avellaneda, Buenos Aires. Tel. (011) 4206-4141. consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, M.V. M.J.L. 3136. En Uruguay: MGAP N° xxx. Imp. y dist. por **KÖNIG URUGUAY S.A.** San Fructuoso 1169, Montevideo, Dr. Téc. Dr. Raúl Leites. Tel. (02) 208-3920 direccioneticauy@koniglab.com En Bolivia: SENASAG N° 00/2011. Imp. y dist. por **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.**, Av. Píra N° 493, Santa Cruz. Tel. (03) 352-0261 Dir. Tec. Ernesto Rojas V. En Ecuador: N° xxx AGROCALIDAD. Imp. y dist. por **ECUQUIMICA C.A.**, Av. Ilaiki Km 1,5 entre Cisnes y Alondras, Via al Tingo, Quito. Tel. 022 861 690. Resp Técnico Dr. Fausto Yáñez. En El Salvador: Imp. y dist. por **SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S.A. DE C.V.**, edificio Avante, suite 5-01, Blvd. Luis Poma, Santa Elena, Antiguo Cuscatlan, El Salvador Tel. (503) 2505 5555/5565. En Guatemala: Imp. y dist. por **SUMINISTROS PORCINOS, S.A.**, 3ª. Av. 41-40, zona 12 col. Monte María I, Centro empresarial Monte María, bodega 104. Tel. (502) 2479 1568 / 2479 0066. Reg. MAGA N° xxx. En Honduras: comerc. y dist. **IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.** Residencial Monte Bello. Bl.43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2565-6847. Med. Reg. Dr. Abelardo Mejía Pineda, y dist. por **DISTRIVET S.A.**, Juan Díaz calle 16, Tel. 507-2056821. Resp. tbc. Dra. Enilda Pinto ID. 728 distrivet@cablonada.net. En Paraguay: Imp. por **CRESUR S.A.**, Juan J.F. Bogado 1482 ATC (021) 333-407-Reg. SENACSA N° 5.220. En Perú: SENASAG Reg. N° xxx. Comerc. por **VETNOVA S.A.** Alameda del corregidor 2720 Urb. La Capilla-La Molina, Lima. Tel.: 3657625. En República Dominicana: Ministerio de Agricultura. Dist. **FLEXEMPAQUES SRL RD4...** Calle 16 de Agosto N°1, Los pepines, Santiago de los Caballeros. Tel. (809) 241-3095/233-3222. En Venezuela: Importado y distribuido por **REPRESENTACIONES ADALCA, C.A.**, Rf. J-30295110-0. Registro N° P.J. 8.156. Tel. 0241-871-6071 / 7340. Valencia, As. Téc. Dr. Carlos Durand M.V. CPE 1207143799.



König
www.koniglab.com