

PROSPECTO KENSOL
MEDIDAS: 100 mm de ancho x 104 mm de alto.

Kensol®

Uso veterinario
Venta con receta veterinaria archivada

Xilazina • Sedante • Miorrelajante • Analgésico
Solución inyectable estéril

KENSOL es una solución estéril de xilazina al 2%, que actúa farmacológicamente produciendo sedación, analgesia y miorrelajación. Es comunmente indicado su uso en asociación con otros anestésicos. El logro de los efectos deseados varía con la dosis, la vía de administración y la especie.

ESPECIES ANIMALES A LAS QUE SE DESTINA: Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos, Aves, Conejos, Caninos, Felinos, Chinchillas, Hámsters, Jerbos, Rata y Ratón.

INDICACIONES DE USO: Sedación, analgesia, relajación muscular y premedicación anestésica en procedimientos diagnósticos, ortopédicos y dentales, en cirugía de corta duración, Agente preanestésico, en anestesia local y general.

ESPECIES, DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Animales	ENDOVENOSA		INTRAMUSCULAR		SUBCUTÁNEA		INTRAPERITONEAL	
	Dosis (mg/kg)	Dosis (mL/kg)	Dosis (mg/kg)	Dosis (mL/kg)	Dosis (mg/kg)	Dosis (mL/kg)	Dosis (mg/kg)	Dosis (mL/kg)
Bovinos	0,05-0,15	0,0025-0,0075	0,10-0,33	0,005-0,0165	-----	-----	-----	-----
Ovinos	0,05-0,10	0,0025-0,0050	0,10-0,22	0,005-0,011	-----	-----	-----	-----
Caprinos	0,05-0,10	0,0025-0,0050	0,10-0,22	0,005-0,011	-----	-----	-----	-----
Equinos	1,00	0,05	2,00	0,10	-----	-----	-----	-----
Aves	1,00-2,00	0,05-0,10	1,00-2,00	0,05-0,10	-----	-----	-----	-----
Caninos	1,00	0,05	1,00-2,00	0,05-0,10	1,00-2,00	0,05-0,10	-----	-----
Felinos	1,00	0,05	1,00-2,00	0,05-0,10	1,00-2,00	0,05-0,10	-----	-----
Conejos	1,00-3,00	0,05-0,15	3,00-5,00	0,15-0,25	3,00-5,00	0,15-0,25	-----	-----
Chinchillas	1,00-3,00	0,05-0,15	3,00-5,00	0,15-0,25	3,00-5,00	0,15-0,25	-----	-----
Hámsters	-----	-----	5,00	0,50	-----	-----	10,00	1,00
Jerbos	-----	-----	5,00	0,50	-----	-----	10,00	1,00
Rata	-----	-----	5,00	0,50	-----	-----	10,00	1,00
Ratón	-----	-----	10,00	1,00	-----	-----	10,00	1,00

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO: Es un agonista alfa 2 adrenérgico. Los efectos farmacodinámicos primarios después de la administración en ganado vacuno, caballos, perros, gatos, ratones, ratas y conejos fueron sedación, analgesia y relajación muscular. A dosis recomendadas la xilazina tiene efectos farmacodinámicos secundarios considerables y variables. Una sola administración intravenosa o intramuscular produce un aumento de la presión arterial de corta duración seguido por un período de hipotensión y bradicardia mas largo. En bovinos, equinos, caninos y felinos: midriasis, termorregulación alterada, depresión respiratoria. En bovinos y ovinos: hiperglucemia, hipoinsulinemia, poliuria, tránsito intestinal prolongado, inhibición de las contracciones retículo ruminal y salvación. En caninos y felinos: vómitos. En equinos, los efectos de la xilazina persistieron durante 2 a 4 horas, mientras que en los rumiantes algunos efectos (hipertermia, hiperglucemia, atonía ruminal, postración) persistieron por 12 a 24 horas.

No asociar con otros tranquilizantes. No administrar por vía intracarotídea ni en la zona perivascular. No administrar en animales que recibieron epinefrina o que presentan arritmia ventricular activa. La xilazina puede ocasionar una arritmia ventricular (ocasionalmente fatal) en presencia de catecolaminas endógenas y exógenas. No debe ser empleada en animales con reserva cardio-pulmonar disminuida. No administrar a hembras en el último mes de preñez por riesgo de parto prematuro. No mezclar en la misma jeringa con otras drogas.

PRECAUCIONES: Ayuno sólido 12 horas antes de la cirugía. En animales grandes garantizar su aplicación vía yugular. Aplicar por vía endovenosa lenta. Mantener al animal en un ambiente tranquilo. En bovinos para eliminar la presentación de timpanismo por la posición de decúbito, colocar al animal en posición torácica. Para evitar que aspire saliva o alimentos regurgitados, colocar la cabeza en un lugar más bajo. Conviene el uso de camras blandas y la sujeción de la cabeza cuando se procede en intervenciones con animales acostados para evitar que se golpeen por cabeceos. Evitar la hipotermia o excesiva exposición a rayos solares. Extremar las medidas de precaución en animales con severa depresión respiratoria, insuficiencia cardíaca, estado de shock profundo. Emplear con cuidado en animales con insuficiencia hepática o renal avanzadas, desórdenes convulsivos pre-existentes ó debilitados en forma severa. Reducir a 1/2 ó 1/3 la dosis habitual de barbitúricos cuando se emplea xilazina como preanestésico. Reducir las dosis de agentes depresores del sistema nervioso central que pueden emplearse conjuntamente con la xilazina dado que pueden causar un efecto depresor aditivo. Ante la sobredosificación accidental administrar analépticos y oxigenoterapia.

PARA PERMITIR UNA MAS RAPIDA INDUCCION DE LOS EFECTOS DE KENSOL SE RECOMIENDA EVITAR RUIDOS O MOVIMIENTOS EN EL AMBIENTE HASTA LLEGAR AL PLANO REQUERIDO.

INTOXICACIÓN Y SOBREDOSIS EN LOS ANIMALES: La sobredosificación produce depresión del sistema nervioso central y consecuentemente del centro respiratorio, bradicardia e hipotensión; sin embargo la dosis necesaria para obtener sedación en equinos es muy inferior a la dosis tóxica por lo cual el producto posee un adecuado margen de seguridad. Ante la sobredosificación accidental administrar analépticos y oxigenoterapia. El empleo de yohimbina (0,075 mg/kg/EV lenta) antagoniza los efectos de la xilazina, acorta el tiempo de recuperación, reduce las complicaciones debidas a la anestesia.

FÓRMULA: Cada mL contiene: Xilazina Base (como clorhidrato) 20 mg; Excip. acuoso estéril c.s.

Conservar por debajo de los 30° C. No refrigerar. No congelar. En Perú: Conservar entre 15 y 30°C, En Costa Rica: Conservar entre 15° y 30° C, si queda un remanente conservar en heladera por 4 semanas, luego de ese periodo descartar. No volver a usar si aparece turbidez. Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

NOTAS: El producto debe ser usado bajo la supervisión de un médico veterinario. El laboratorio no se hace responsable por el mal uso que se le da al producto. Las indicaciones y precauciones indicadas en los prospectos respectivos de las medicaciones asociadas deben ser respetadas.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En Costa Rica: Venta exclusiva con receta médico veterinaria controlada.

LABORATORIOS KÖNIG S.A. Uruguay 720, B1868BAB, Avellaneda, Buenos Aires Tel. (011) 4208-4141 consultatecnica@koniglab.com Dir. Tec. Dr. Oscar Hortas, M.V. M.P. N°: 2216.

Centros Toxicológicos: Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Costa Rica:** Centro Nac. de Intoxicaciones Tel. 2223-1028. **Ecuador:** Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX): 1800-VENENO (836366) a Nivel Nacional. **El Salvador:** Hospital San Rafael teléfono 2525-5800 ext 148 y 149. **Guatemala:** CIAT tel. (502) 22513560 (502) 2232-0735. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **México:** Serv. de Int. Toxicológica SINTOX 01800-009-2800. **Nicaragua:** Centro Nac. de prev. y control de sust. Tox. Tel. 289-7150/ 289-3328. **Panamá:** CIMET Tel.: (507) 269-2741. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-800 (int. 1011); 220-418. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **República Dominicana:** CIDI. Tel.: (1809)562-6601 ext. 1801. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **República Bolivariana de Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.

En Argentina:
SENASA Cert. N° 87.509
Estab. Est. N° 5.580
Importado y distribuido en: Ver estuche

PA9300-V5

